

Hyper-CVAD療法

	Day1	Day2	Day3	Day4	Day8	Day11
注射	<p>中心静脈注射 生理食塩液PL「フソー」 100mL … 1瓶 ルート確保用 1回</p> <hr/> <p>中心静脈注射 グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「H K」 … 1袋 所要時間:0時間30分 1回</p> <hr/> <p>中心静脈注射 エンドキサン注 … 300mg/m2 生理食塩液バッグ「フソー」 250mL … 1袋 所要時間:3時間 投与間隔:12時間毎 1回</p> <hr/> <p>中心静脈注射 エンドキサン注 … 300mg/m2 生理食塩液バッグ「フソー」 250mL … 1袋 所要時間:3時間 投与間隔:12時間毎 1回</p>	<p>中心静脈注射 生理食塩液PL「フソー」 100mL … 1瓶 ルート確保用 1回</p> <hr/> <p>中心静脈注射 グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「H K」 … 1袋 所要時間:0時間30分 1回</p> <hr/> <p>中心静脈注射 エンドキサン注 … 300mg/m2 生理食塩液バッグ「フソー」 250mL … 1袋 所要時間:3時間 投与間隔:12時間毎 1回</p> <hr/> <p>中心静脈注射 エンドキサン注 … 300mg/m2 生理食塩液バッグ「フソー」 250mL … 1袋 所要時間:3時間 投与間隔:12時間毎 1回</p> <hr/> <p>脳脊髄腔内注射 メソレキセート注 … 12mg 注射用水 … 4.8mL 1回</p>	<p>中心静脈注射 生理食塩液PL「フソー」 100mL … 1瓶 ルート確保用 1回</p> <hr/> <p>中心静脈注射 グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「H K」 … 1袋 所要時間:0時間30分 1回</p> <hr/> <p>中心静脈注射 エンドキサン注 … 300mg/m2 生理食塩液バッグ「フソー」 250mL … 1袋 所要時間:3時間 投与間隔:12時間毎 1回</p> <hr/> <p>中心静脈注射 エンドキサン注 … 300mg/m2 生理食塩液バッグ「フソー」 250mL … 1袋 所要時間:3時間 投与間隔:12時間毎 1回</p>	<p>中心静脈注射 生理食塩液PL「フソー」 100mL … 1瓶 ルート確保用 1回</p> <hr/> <p>中心静脈注射 グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「H K」 … 1袋 所要時間:0時間30分 1回</p> <hr/> <p>中心静脈注射 エンドキサン注 … 300mg/m2 生理食塩液バッグ「フソー」 250mL … 1袋 所要時間:3時間 投与間隔:12時間毎 1回</p> <hr/> <p>精密持続点滴 ドキシルビシン注 … 50mg/m2 生理食塩液バッグ「フソー」 500mL … 1袋 24時間投与 1回</p>	<p>脳脊髄腔内注射 キロサイド注 … 100mg/body 1回</p>	<p>中心静脈注射 生理食塩液PL「フソー」 100mL … 1瓶 ルート確保用 1回</p> <hr/> <p>中心静脈注射 オンコピン注 … 2mg/body 生理食塩液PL「フソー」 50mL … 1瓶 所要時間:0時間30分 1回</p>