

ALL(地固め療法C1)

	Day1	Day2	Day3
注射	<p>中心静脈注射 生理食塩液PL「フソー」 100mL … 1瓶 ルート確保用 1回</p>	<p>中心静脈注射 生理食塩液PL「フソー」 100mL … 1瓶 ルート確保用 1回</p>	<p>中心静脈注射 生理食塩液PL「フソー」 100mL … 1瓶 ルート確保用 1回</p>
	<p>中心静脈注射 グラニセロン点滴静注バッグ1mg/50 mL「HK」… 1袋 所要時間:0時間30分 1回</p>	<p>中心静脈注射 グラニセロン点滴静注バッグ1mg/50 mL「HK」… 1袋 所要時間:0時間30分 1回</p>	<p>中心静脈注射 グラニセロン点滴静注バッグ1mg/50 mL「HK」… 1袋 所要時間:0時間30分 1回</p>
	<p>中心静脈注射 メトレキセート注 … 100mg/m2 生理食塩液バッグ「フソー」 250mL … 1袋 所要時間:1時間0分 1回</p>	<p>中心静脈注射 キロサイド注 … 2000mg/m2 生理食塩液バッグ「フソー」 500mL … 1袋 所要時間:3時間0分 投与間隔:12時間毎 1回</p>	<p>中心静脈注射 キロサイド注 … 2000mg/m2 生理食塩液バッグ「フソー」 500mL … 1袋 所要時間:3時間0分 投与間隔:12時間毎 1回</p>
	<p>中心静脈注射 メトレキセート注 … 900mg/m2 生理食塩液バッグ「フソー」 500mL … 1袋 所要時間:23時間0分 1回</p>	<p>中心静脈注射 キロサイド注 … 2000mg/m2 生理食塩液バッグ「フソー」 500mL … 1袋 所要時間:3時間0分 投与間隔:12時間毎 1回</p>	<p>中心静脈注射 キロサイド注 … 2000mg/m2 生理食塩液バッグ「フソー」 500mL … 1袋 所要時間:3時間0分 投与間隔:12時間毎 1回</p>
	<p>脳脊髄腔内注射 メトレキセート注 … 15mg/body デキサート注射液3. 3mg … 1管 生理食塩液 … 3mL 1回</p>	<p>中心静脈注射 ソル・メドロール静注用50mg 生理食塩液PL「フソー」 50mL … 1瓶 所要時間:0時間15分 投与間隔:12時間毎 1回</p>	<p>中心静脈注射 ソル・メドロール静注用50mg 生理食塩液PL「フソー」 50mL … 1瓶 所要時間:0時間15分 投与間隔:12時間毎 1回</p>
	<p>中心静脈注射 ソル・メドロール静注用50mg 生理食塩液PL「フソー」 50mL … 1瓶 所要時間:0時間15分 投与間隔:12時間毎 1回</p>	<p>中心静脈注射 ソル・メドロール静注用50mg 生理食塩液PL「フソー」 50mL … 1瓶 所要時間:0時間15分 投与間隔:12時間毎 1回</p>	<p>中心静脈注射 ソル・メドロール静注用50mg 生理食塩液PL「フソー」 50mL … 1瓶 所要時間:0時間15分 投与間隔:12時間毎 1回</p>
	<p>中心静脈注射 ソル・メドロール静注用50mg 生理食塩液PL「フソー」 50mL … 1瓶 所要時間:0時間15分 投与間隔:12時間毎 1回</p>	<p>中心静脈注射 ソル・メドロール静注用50mg 生理食塩液PL「フソー」 50mL … 1瓶 所要時間:0時間15分 投与間隔:12時間毎 1回</p>	<p>中心静脈注射 ソル・メドロール静注用50mg 生理食塩液PL「フソー」 50mL … 1瓶 所要時間:0時間15分 投与間隔:12時間毎 1回</p>