

MEC療法

	Day1	Day2	Day3	Day4
注射	中心静脈注射 生理食塩液PL「フソー」 100mL … 1瓶 ルート確保用 1回	中心静脈注射 生理食塩液PL「フソー」 100mL … 1瓶 ルート確保用 1回	中心静脈注射 生理食塩液PL「フソー」 100mL … 1瓶 ルート確保用 1回	中心静脈注射 生理食塩液PL「フソー」 100mL … 1瓶 ルート確保用 1回
	中心静脈注射 グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50 mL「H K」… 1袋 所要時間:0時間30分 1回	中心静脈注射 グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50 mL「H K」… 1袋 所要時間:0時間30分 1回	中心静脈注射 グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50 mL「H K」… 1袋 所要時間:0時間30分 1回	中心静脈注射 グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50 mL「H K」… 1袋 所要時間:0時間30分 1回
	中心静脈注射 ノバントロン注 … 8mg/m2 生理食塩液PL「フソー」 100mL … 1瓶 所要時間:0時間30分 1回	中心静脈注射 ノバントロン注 … 8mg/m2 生理食塩液PL「フソー」 100mL … 1瓶 所要時間:0時間30分 1回	中心静脈注射 ノバントロン注 … 8mg/m2 生理食塩液PL「フソー」 100mL … 1瓶 所要時間:0時間30分 1回	中心静脈注射 キロサイド注 … 1000mg/m2 生理食塩液バッグ「フソー」 500mL … 1袋 所要時間:2時間0分 投与間隔:12時間毎 1回
	中心静脈注射 キロサイド注 … 1000mg/m2 生理食塩液バッグ「フソー」 500mL … 1袋 所要時間:2時間0分 投与間隔:12時間毎 1回	中心静脈注射 キロサイド注 … 1000mg/m2 生理食塩液バッグ「フソー」 500mL … 1袋 所要時間:2時間0分 投与間隔:12時間毎 1回	中心静脈注射 キロサイド注 … 1000mg/m2 生理食塩液バッグ「フソー」 500mL … 1袋 所要時間:2時間0分 投与間隔:12時間毎 1回	中心静脈注射 グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50 mL「H K」… 1袋 所要時間:0時間30分 投与時間:夕 1回
	中心静脈注射 ペプシド注 … 80mg/m2 生理食塩液バッグ「フソー」 500mL … 1袋 所要時間:2時間0分 1回	中心静脈注射 ペプシド注 … 80mg/m2 生理食塩液バッグ「フソー」 500mL … 1袋 所要時間:2時間0分 1回	中心静脈注射 ペプシド注 … 80mg/m2 生理食塩液バッグ「フソー」 500mL … 1袋 所要時間:2時間0分 1回	中心静脈注射 キロサイド注 … 1000mg/m2 生理食塩液バッグ「フソー」 500mL … 1袋 所要時間:2時間0分 投与間隔:12時間毎 1回
	中心静脈注射 グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50 mL「H K」… 1袋 所要時間:0時間30分 投与時間:夕 1回	中心静脈注射 グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50 mL「H K」… 1袋 所要時間:0時間30分 投与時間:夕 1回	中心静脈注射 グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50 mL「H K」… 1袋 所要時間:0時間30分 投与時間:夕 1回	
	中心静脈注射 キロサイド注 … 1000mg/m2 生理食塩液バッグ「フソー」 500mL … 1袋 所要時間:2時間0分 投与間隔:12時間毎 1回	中心静脈注射 キロサイド注 … 1000mg/m2 生理食塩液バッグ「フソー」 500mL … 1袋 所要時間:2時間0分 投与間隔:12時間毎 1回	中心静脈注射 キロサイド注 … 1000mg/m2 生理食塩液バッグ「フソー」 500mL … 1袋 所要時間:2時間0分 投与間隔:12時間毎 1回	